



PACIFICA[®]
PLUS >>

Pacifica[®] Plus — le cauchemar des adventices



Bayer CropScience

Triple action contre graminées et dicotylédones

Le vulpin, le ray-grass et l'agrostide jouet-du-vent sont des hôtes indésirables dans les céréales. Avec Pacifica® Plus, l'agriculteur peut lutter efficacement contre ces adventices ainsi que contre de nombreuses autres dicotylédones. Pacifica® Plus est composé d'une combinaison de matières actives très efficace.



» **L'action:** La solution complète se compose de 3 matières actives et d'un antidote. Le Mesosulfuron agit contre les graminées telles le vulpin, l'agrostide et le ray-grass alors que le lodosulfuron et l'Amidosulfuron agissent contre de nombreuses dicotylédones telles le gaillet, la pensée, le coquelicot, l'ortie royale, la camomille, les renouées, le rumex et le chardon.

» **Les avantages:** La combinaison de matières actives offre un large spectre d'efficacité contre les principales adventices présentes dans les céréales et offre ainsi une solution complète confortable. Grâce à l'additif Mero®, Pacifica® Plus adhère très bien sur les feuilles, même sur les plus petites. La seule condition requise à la bonne efficacité du produit est une croissance

active des plantes.

La température ne joue aucun rôle.

» **Les effets:** Pacifica® Plus offre un rapport entre les matières actives tout à fait optimal. Après l'application, la croissance des mauvaises herbes est stoppée puis elles dépérissent. Ce processus peut prendre quelques semaines mais cela n'a plus aucune incidence sur la culture.

» **Les bénéfiques:** Les adventices les plus problématiques n'ont aucune chance contre Pacifica® Plus. La concurrence des mauvaises herbes envers la culture est éliminée de manière très ciblée. Pacifica® Plus est simple à utiliser et très sélectif envers toutes les céréales.

Points forts du Pacifica® Plus



Vulpin



Ray-grass



Agrostide



Pâturin annuel



Chardon



Rumex (lampé)



Pensée



Gaillet gratteron



Camomille



Renouées



Coquelicot



Lamier rouge



PACIFICA
PLUS

Lutte efficace contre les graminées
Spectre d'efficacité très large
Très haute sélectivité

Spectre d'efficacité de Pacifica® Plus

Dicotylédones

Bleuet	■ ■
Camomille	■ ■ ■ ■
Coquelicot	■ ■ ■ ■
Capselle	■ ■ ■ ■
Farineuses	■ ■ ■ ■
Gaillet gratteron	■ ■ ■ ■
Géraniums	■ ■
Laiteron des champs	■ ■ ■ ■
Lamier rouge	■ ■ ■ ■
Mouron des oiseaux	■ ■ ■ ■
Moutarde jaune	■ ■ ■ ■
Myosotis	■ ■ ■ ■
Ortie royale	■ ■ ■ ■
Pensée des champs	■ ■ ■ ■
Ravenelle	■ ■ ■ ■
Renouées	■ ■ ■ ■
Seneçon	■ ■ ■ ■
Véroniques	■ ■ ■ ■
Vesce	■ ■ ■ ■

Diverses graminées

Bromes ¹	■ ■ ■ ■
Ray-grass	■ ■ ■ ■

Graminées

Agrostide jouet du vent	■ ■ ■ ■
Folle avoine	■ ■ ■ ■
Pâturin annuel	■ ■ ■ ■
Vulpin des champs	■ ■ ■ ■

Mauvaises herbes vivaces

Chardon des champs	■ ■ ■ ■
Liseron	■ ■ ■ ■
Rumex	■ ■ ■ ■

Diverses

Ambroisie	■ ■ ■ ■
Repousses de p.d.t.	■ ■ ■ ■
Repousses de colza	■ ■ ■ ■
Repousses de tournesol	■ ■ ■ ■

Efficacité

Très bonne	■ ■ ■ ■
Bonne	■ ■ ■ ■
Suffisante	■ ■ ■ ■
Effet partiel	■ ■ ■ ■
¹ Selon conseils	■ ■ ■ ■

l'herbicide céréale

Matières actives

5% Amidosulfuron
3% Mésosulfuron
1% Iodosulfuron
9% Méfenpyr-Diéthyle (safe-
ner)

Formulation

WG (granulés à disperser
dans l'eau)

Cultures

Blé, blé dur, triticale

Dosage

0,3–0,4 kg/ha Pacifica® Plus
+ 1 l/ha Mero sur blé, blé dur
et triticale

Fenêtre d'application

Printemps: Post-levée
3 feuilles jusqu'à 2 nœuds
des céréales (BBCH 13–32)

Emballage

1 kg (10 x 1 kg)

Prescription agronomique

Mélange obligatoire: Pacifica®
Plus + 1 l/ha Mero (mouillant
et adhésif)

Recommandation d'emploi pour Pacifica Plus

Blé d'automne, blé dur, triticale:

0,3-0,4 kg/ha de Pacifica® Plus + 1 l/ha de Mero contre la majorité des graminées et mauvaises herbes au printemps du stade 3 feuilles jusqu'au stade 2 nœuds (BBCH 13-32) de la céréale. Dosage inférieur contre agrostides et pâturins. Dosage supérieur lors d'une forte pression de vulpins et ray-grass. L'adjonction de 0,5–0,8 kg/ha d'Artist® permet de prévenir la résistance de l'agrostide aux sulfonylurées.

Blé de printemps:

0,3 kg/ha de Pacifica® Plus + 1 l/ha de Mero contre la majorité des graminées et mauvaises herbes du stade 3 feuilles jusqu'au stade 2 nœuds (BBCH 13-32) de la céréale. L'adjonction de 0,5 kg/ha d'Artist® permet de prévenir la résistance de l'agrostide aux sulfonylurées et renforce l'effet sur véroniques.

Remarques importantes:

Lors de l'adjonction d'Artist®, il est absolument nécessaire de traiter sur des plantes sèches. Après l'application, une période sans pluie de 5 heures est favorable à l'efficacité.





Bayer CropScience

Bayer (Schweiz) AG
CropScience
Postfach 216
3052 Zollikofen

Téléphone: 031 869 16 66
www.agrar.bayer.ch

Pacifica Plus contient Amidosulfuron, Mésosulfuron, Iodosulfuron et Méfenpyr-Diéthyle (safener).
Observer les risques de danger et les mesures de sécurité sur les emballages.