



Réduction des risques liés à la dérive et au ruissellement lors de l'application des produits phytosanitaires Bayer

| Herbicides | Réduction risques D: dérive en mètres R: ruissellement en mètres (m) ou points (p) | Cultures / Indications Dosages par ha PrL = pré-levée / PoL = post-levée | Restrictions supplémentaires |
|-----------------------------|---|--|---|
| Adengo (W 6736) | R: 6 m | Maïs | Pas en zone S2. |
| Artist (W 6225) | D: 6 m / R: 3 p D: 6 m / R: 2 p D: 20 m / R: 3 p R: 1 p | Pomme de terre (1,5-1,7 kg) Pomme de terre (1 kg) Pomme de terre (dès 2 kg), soja, asperge Céréales (0,8 kg/ha) | |
| Aspect (W 6505) | D: 6 m R: 3 p R: 2 p R: 1 p | Maïs Maïs (2 l/ha) Maïs (1,5 l/ha) Maïs (1 l/ha) | Pas en zone karstique et S2. Max. 0,75 kg/ha/par- celle de Terbutylazi- ne sur 3 ans. |
| Bandur (W 6149) | D: 20 m R: 2 p R: 3 p R: 4 p | Toutes les indications Pois protéagineux (PoL), céleri, pois (PoL) Féverole (2 l), lupin, pois proté- agineux (2 l), pomme de terre (1,5-2 l), sorgho, tournesol (2 l), ail, carotte, carvi (PoL), échalote, fenouil bulbeux, oignon, pois (PrL) Féverole (2,25-3 l), pois protégi- neux (2,25-3 l), pomme de terre (2,25-3 l), tournesol (2,25-3 l), aneth, carvi (PrL), coriandre, fe- nouil aromatique, lentille, panais, topinambour | |
| Betanal maxxPro (W 6692) | D: 6 m / R: 6 m | Betterave, betterave à salade | Pas en zone S2. |
| Boxer (W 6168-1) | R: 6 m | Grandes cultures, légumes | |
| Conviso One (W 7261) | D: 6 m R: 1 p R: 2 p | Betterave Betterave (1 x 0,5-0,7 l) Betterave (2 x 0,5 ou 1 x 1 l) | |
| Equip (W 6222) | D: 6 m R: 1 p R: 2 p | Maïs Maïs (1-1,5 l) Maïs (2 l) | |
| Equip Power (W 6811) | D: 6 m R: 1 p R: 2 p | Maïs Maïs (1-1,25 l) Maïs (1,5 l) | |
| Herold Flex (W 7212) | D: 6 m R: 2 p R: 1 p | Céréales, traitement <u>en automne</u> Céréales, traitement <u>en automne</u> (1 l) Céréales, traitement <u>en automne</u> (0,375-0,75 l) | |
| Othello Star (W 7313) | D: 6 m (biotopes) | Céréales | |

| Herbicides | Réduction risques D: dérive en mètres R: ruissellement en mètres (m) ou points (p) | Cultures / Indications Dosages par ha PrL = pré-levée / PoL = post-levée | Restrictions supplémentaires |
|-------------------------|---|---|--|
| Pacifica Plus (W 6862) | R: 6 m | Céréales | |
| Primus (W 5778) | D: 6 m (biotopes) | Céréales | |
| Rodino Ready (W 6837-1) | D: 20 m / R: 6 m | Colza Pois protéagineux, soja, haricot | Pas en zone S2. Max. tous les 2 ans sur la même parcelle Pas en zone S2. |
| Sencor SC (W 6630) | R: 6 m | Pomme de terre (PrL), asperge | |
| Venzar (W 7306-1) | D: 20 m / R: 6 m | Betterave, betterave à salade, épinard | Pas en zone S2. |

| Fongicides | Réduction risques D: dérive en mètres (m) R: ruissellement en mètres (m) ou points | Cultures / Indications Dosages par ha PrL = pré-levée / PoL = post-levée | Restrictions supplémentaires |
|------------------------|---|---|--|
| Agora SC (W 6394) | D: 6 m / R: 6 m | Betterave à salade | |
| Aliette WG (W 6325) | D: 6 m | Poire | |
| Aviator Xpro (W 6761) | R: 6 m | Céréales | |
| Captan 80 WDG (W 6635) | D: 20 m | Arboriculture | |
| Consento (W 6374) | D: 20 m 20 m | Tabac Tomate | |
| Cyrano (W 6219) | D: 6 m / R: 6 m | Viticulture | |
| Fandango (W 6508) | D: 6 m / R: 6 m | Légumes | |
| Folpet 80 WDG (W 6680) | D: 6 m / R: 6 m D: 20 m / R: 6 m | Viticulture Arboriculture | |
| Horizont (W 5468) | D: 6 m | Colza (printemps), lin, lupin, graminées, asperge | |
| Infito (W 6706) | | Pommes de terre | Pas en zone S2. Max. tous les 3 ans sur la même parcelle. |
| Input (W 6392) | D: 20 m R: 1 pt R: 2 pts | Céréales Céréales (0,65 l, 0,75 l, fusarioses sur épi) Céréales (1,25 l) | |
| Melody Combi (W 6070) | D: 6 m / R: 6 m | Viticulture | |
| Mikal (W 6265) | D: 6 m / R: 6 m | Viticulture | |

| Fongicides | Réduction risques D: dérive en mètres (m) R: ruissellement en mètres (m) ou points | Cultures / Indications Dosages par ha PrL = pré-levée / PoL = post-levée | Restrictions supplémentaires |
|--------------------------|---|---|-------------------------------------|
| Moon Experience (W 6856) | R: 6 m D: 20 m | Oignon, poireau Arboriculture, viticulture (traitement au sol) | |
| Moon Sensation (W 6961) | D: 20 m | Arboriculture, petits fruits (sauf fraise) | |
| Nativo (W 6588) | R: 6 m D: 20 m | Poireau Asperge | |
| Pronto Plus (W 5935) | D: 20 m R: 1 pt R: 2 pts | Céréales Céréales (fusarioses de l'épi) Céréales (autres indications) | |
| Prosper (W 5934) | D: 50 m D: 60 m R: 2 pts R: 3 pts | Viticulture (traitement au sol) Viticulture (traitement aérien) Viticulture (1 traitement) Viticulture (2-3 traitements) | |
| Rucolan (W 7127-2) | D: 20 m / R: 6 m D: 50 m / R: 6 m | Viticulture Arboriculture | |
| Teldor (W 5751) | D: 6 m D: 20 m | Viticulture, cassis, espèces de Rubus, groseille à maquereau, myrtille, raisinet, aubergine, concombre, haricot à rames, haricot nain, poivron Fruits, mini-kiwi, sureau noir | |
| Tilmor (W 6834) | D: 6 m / R: 6 m | Colza | |
| Tisca (W 6747-1) | D: 20 m / R: 4 p D: 50 m / R: 3 p | Pommes de terre, oignon Viticulture | |
| Sico (W 5056-3) | D: 6 m D: 20 m R: 1 pt R: 2 pts | Viticulture Arboriculture, petits fruits (sauf fraise) P. d. t., concombre, courge à peau comestible, tomate Fraise, légumes (sauf concombres, courge à peau comestible, tomate) | |

| Insecticides | Réduction risques D: dérive en mètres (m) R: ruissellement en mètres (m) ou points (p) | Cultures / Indications Dosages par ha PrL = pré-levée / PoL = post-levée | Restrictions supplémentaires |
|---------------------------|---|---|-------------------------------------|
| Alanto (W 5933) | D: 6 m D: 20 m / R: 6 m D: 50 m / R: 6 m | Fraise Petits fruits (sauf fraise) Arboriculture | |
| Biscaya (W 6401) | D: 6 m / R: 6 m | Grandes cultures, légumes | |
| Decis Protech (W 6381) | D: 50 m / R: 6 m D: 100 m / R: 6 m | Dosages jusqu'à 0,5 l/ha Dosages > 0,5 l/ha (sauf serre) | |
| Envidor (W 6155) | D: 6 m D: 6 m (biotopes) D: 20 m D: 20 m (biotopes) D: 50 m (biotopes) | Viticulture (acarien), petits fruits (sauf fraise) Viticulture (acarirose) Arboriculture Viticulture (acarien), petits fruits (sauf fraise) Arboriculture | |

Etat: 01.12.2020

Les indications mentionnées dans ce document et qui sont publiées par l'OFAG dans l'index des produits phytosanitaires sont en vigueur. Cependant, les firmes phytosanitaires ont un délai d'une année pour adapter leurs étiquettes. Cela signifie que le producteur qui applique un produit selon son étiquette durant l'année de transition n'est pas punissable.

Pour des informations détaillées, voir le document „Instructions relatives aux mesures de réduction des risques lors de l'application de produits phytosanitaires“ de l'OFAG du 26.03.2020.
Lien: <https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel/nachhaltige-anwendung-und-risikoreduktion.html> sous „Protection des eaux superficielles et biotopes“.